



Albubilla

NOMBRE CIENTÍFICO:

- *Upupa epops*

FAMILIA:

- *Upupidae*

ORDEN:

- Coraciiformes



DESCRIPCIÓN:

- Longitud: 25-29 cm. (incluidos 4-5 cm. del pico) / Envergadura: 44-48 cm.
- Tiene el plumaje del cuerpo pardo anaranjado, las alas y la parte posterior de la espalda negras con franjas blancas; y el pecho blancuzco.
- Está dotada de una cresta que, como la cabeza, también es de color pardo anaranjado, y la punta de cada pluma tiene una mancha de color negro.
- La rabadilla es blanca, y la cola negra con una banda transversal blanca hacia la mitad.

HÁBITAT:

- Ave común en las dehesas y en los terrenos abiertos en general con arbolado disperso.
- En las áreas boscosas sólo se encuentra en las inmediaciones, pues es una especie que evita vivir en el interior del bosque.
- También se puede encontrar en roquedos, donde oculta el nido en alguna oquedad.



COSTUMBRES Y ALIMENTACIÓN:

- Pasa mucho tiempo en el suelo y necesita algunas zonas de hierbas bajas o desnudas para alimentarse.
- Su dieta principal son los gusanos y los insectos.
- Cautelosa (aunque no exactamente tímida), se mantiene a distancia del hombre.
- Vuelo pausado, con pauta muy ondulada.
- Al andar, como sucede con lavanderas (*Motacilla* spp.) y palomas (*Columba* spp.), mueve acompasadamente la cabeza de atrás hacia adelante.

CRÍA Y NIDIFICACIÓN:

- Zonas agrícolas y terrenos abiertos con bosquecillos, setos vivos y arbustos, son los preferidos por esta especie para la cría.
- Nidifica en agujeros que encuentra en los gruesos troncos de los árboles, en construcciones humanas o en roquedos.
- Anida en huecos de árboles, paredes de piedra, cajas nido.



- Normalmente no lleva material al nido, pero acumula desechos.
- Durante la época de cría la hembra desprende un desagradable olor, originado por una secreción de la glándula que tiene en la rabadilla. De ahí que, erróneamente, mucha gente crea que la abubilla tiene ese olor durante todo el año.
- El olor desprendido en el nido de abubilla es un mecanismo de defensa para mantener alejados a sus enemigos.
- La puesta es de abril a junio y pone de 5 a 8 huevos gris claro

a crema.

- La incubación dura 18 días y la realiza sólo la hembra.
- Los pollos son alimentados por ambos padres y abandonan el nido a las 3 ó 4 semanas.
- A veces se producen dos crías al año.





DISTRIBUCIÓN Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS:

- Estival en la Península Ibérica (marzo-octubre), excepto en el Sur y el Este, donde es residente o invernante.

CURIOSIDADES:

- Sólo abre la cresta cuando se posa, cuando se inquieta o cuando está excitada.

ZONAS DE AVISTAMIENTO:

- Durante el primer período de muestreo, se han identificado dos individuos de esta especie.
- El primero se pudo ver en la zona de Las Tabas, concretamente en un aulagar con árboles dispersos, situado en la parte nororiental de lo que se correspondería al área de estudio.
- La segunda abubilla fue avistada posteriormente, en el Área Recreativa Valdehierro, entre los árboles cercanos a la ermita del mismo nombre.

FECHAS DE AVISTAMIENTO:

- Octubre (la primera a mediados y la segunda a finales del mes).

