



Buitre Leonado

NOMBRE CIENTÍFICO:


- *Gyps fulvus*

FAMILIA:

- *Accipitridae*

ORDEN:

- *Falconiformes*



DESCRIPCIÓN:

- Es un ave muy grande de alas enormes, cola corta de punta cuadrada.
- Cuello largo, con gorgueras en la base, en vuelo lo lleva recogido.
- Con cabeza y cuello desprovistos de plumas, pero cubierto de plumón blanco-cremoso.
- Dorso leonado, más o menos claro según individuos, plumas del extremo de las alas y de la cola marrón oscuro. Gorguera de la base del cuello blanca o ante pálido.
- Pico muy fuerte preparado para desgarrar tejidos muy duros. Garras sin función prensil.
- Puede vivir 37 años.

HÁBITAT:

- Habita todo tipo de terrenos excepto bosques y espesuras que no tengan grandes claros.



COSTUMBRES Y ALIMENTACIÓN:

- El buitre está especialmente adaptado para alimentarse de carroña.
- Su potente vista localiza cualquier cadáver en las cercanías, y cuando desciende para alimentarse (formándose entonces aglomeraciones importantes de buitres, de forma muy rápida, donde no faltan las peleas por las mejores tajadas), introduce sin problemas su cabeza y largo cuello, provistos únicamente de un plumón corto en el que la sangre y la carne no se adhieren fácilmente.
- Dada la escasez de grandes ungulados en Europa como ciervos, gamos o muflones debido a la caza y la desaparición de los bosques, las carroñas dejadas por los pastores constituyen una parte importante de la dieta de este animal.

CRÍA Y NIDIFICACIÓN:

- Los buitres leonados entran en celo en los meses de diciembre a abril.
- Instalan sus nidos en grietas y repisas de cortados.
- En ese momento forman parejas estables y pasan unos 58 días incubando su único huevo, en turnos de entre un día o dos cada uno.
- Posteriormente se turnan con la misma frecuencia para dar de comer a su cría.
- Las crías emprenden su primer vuelo hacia el mes de julio, pero siguen manteniéndose una temporada cerca del nido hasta que creen que ha llegado el momento de independizarse.
- A los cuatro o cinco años de edad se aparean por primera vez.



DISTRIBUCIÓN Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS:

- En la Península Ibérica es una especie sedentaria que se puede ver todo el año, pero las poblaciones de otros lugares a veces emigran al sur para invernar y vuelven a sus lugares de origen para reproducirse.
- Se distribuye por toda la Península Ibérica, salvo en el extremo noroeste, es raro en la costa de Levante.



CURIOSIDADES:

- Tiene costumbres bastante comunales, desarrollando una estructura jerárquica muy marcada en el acceso a una carroña.
- En general resulta más eficiente que el buitre negro cuando ha de buscar carroñas en rañas y llanuras, en tanto que el buitre negro localiza mejor el alimento en zona de matorral y monte bajo

ZONAS DE AVISTAMIENTO:

- Se ha podido apreciar individuo sobrevolando la cresta del Mingoliva.

FECHAS DE AVISTAMIENTO:

- Mediados de octubre.

