



Carbonera común

NOMBRE CIENTÍFICO:

- *Parus major*

FAMILIA:

- *Paridae*

ORDEN:

- Passeriformes



DESCRIPCIÓN:

- Longitud: 13.5-15 cm.
- Pájaro de apariencia robusta.
- Vientre amarillo con una franja longitudinal negra que nace en la garganta.
- Mejillas blancas sobre un fondo negro azulado que cubre la cabeza.
- Dorso y alas azul verdoso.
- En las alas hay una franja blanca que las atraviesa.
- La hembra tiene menos brillo en las partes oscuras y la franja negra del vientre es más estrecha.

HÁBITAT:

- No es muy exigente en su hábitat, solo necesita de árboles donde haya cavidades para hacer su nido.
- Bosques caducifolios o de coníferas, campo abierto con setos o árboles, parques y jardines.
- Es fácil verlo en las cercanías del hombre y suele utilizar las cajas nido.



COSTUMBRES Y ALIMENTACIÓN:

- Visitante frecuente de los comederos para aves y por tanto muy familiar.
- Se alimenta de insectos, semillas, sebo, hayucos, etc.
- Se adaptan al tipo de alimento que más abunde en cada época.



CRÍA Y NIDIFICACIÓN:

- Anida en nidales espaciosos, huecos de árboles, conductos de aire e incluso buzones.
- Cría en todo tipo de terrenos arbolados y en la proximidad del hombre en parques y jardines.
- Pone 5-11 huevos blanquecinos con motas pardas.
- La hembra incuba los huevos durante 13-14 días. A los 20 días abandonan el nido.

DISTRIBUCIÓN Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS:

- Presente en toda la Península Ibérica como residente.

CURIOSIDADES:

- El macho se coloca delante de las cavidades que pueden albergar el nido y se las muestra a la hembra.
- Ésta elige la que más le gusta y construye su nido.
- Atrevido y algunas veces audaz, llegando a tomar semillas en la mano.

ZONAS DE AVISTAMIENTO:

- Se puede observar en multitud de sitios.
- Individuos aislados se encuentran tanto en zonas de pinar como de bosque mediterráneo, incluso en los propios jardines de Cinco casas.

FECHAS DE AVISTAMIENTO:

- Octubre y noviembre.

