



Cernícalo vulgar

NOMBRE CIENTÍFICO:

- *Falco Tinnunculus*

FAMILIA:

- *Falconidae*

ORDEN:

- *Falconiforme*



DESCRIPCIÓN:

- El cernícalo es relativamente pequeño comparado con otras rapaces.
- Miden de 34 - 38 cm. de cabeza a cola y 70 - 80 centímetros de envergadura de alas.
- El macho medio pesa cerca de 155 g. y la hembra cerca de 190 g.
- Tiene alas largas de color bermejo con manchas negras, El plumaje de los machos en la cabeza es azul-grisáceo, tiene cabeza obispillo.
- El macho tiene cola gris azulada, con ancha banda negra cerca del final de la cola; la hembra tiene cola barrada, también con banda negra.

HÁBITAT:

- Utilizan todos los hábitats existentes en la Península, aunque parece existir una mayor preferencia por los terrenos abiertos y ocupados por cultivos o matorral bajo e incluso utiliza las grandes ciudades para reproducirse.

COSTUMBRES Y ALIMENTACIÓN:



- El cernícalo es un ave de presa diurna y fácil de ver.
- Cuando caza, el cernícalo permanece en vuelo estacionario, casi inmóvil, entre 10 y 20 m de altura, esperando avistar alguna presa y cuando aparece, se precipita en picado hacia ella. (a esto se le llama cernirse).
- Sus presas suelen ser pequeños mamíferos, fundamentalmente roedores, pequeños pájaros, reptiles, grandes insectos, gusanos y ranas.



CRÍA Y NIDIFICACIÓN:

- Los cernícalos nidifican en grietas de rocas o edificios, en huecos de árbol, ocupan nidos de córvidos y otras aves, pero también directamente sobre el suelo, no construye nido.
- Se reproduce entre los meses de abril y agosto fundamentalmente.
- Las puestas suelen tener entre tres y seis huevos blancos con manchas rojo-acastañadas; incubación de unos 28 días, realizada por la hembra mientras el macho la alimenta.
- Los pollos, alimentados por ambos padres, vuelan tras unos 30 días.

DISTRIBUCIÓN Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS:

- Dependiendo del lugar donde críe, la especie se puede considerar sedentaria o migradora.
- Las poblaciones del norte de Europa son todas ellas migradoras mientras que las poblaciones Ibéricas se pueden considerar migradoras parciales con pequeños desplazamientos al acabar la época de cría.
- Paralelamente, los movimientos dispersivos pueden ser diferentes entre sexos y según la edad de los individuos.



CURIOSIDADES:

- Es un ave que se suele utilizar como iniciación en el mundo de la cetrería, es usada por principiantes y novatos para introducirse en este arte de caza.
- Su vuelo es muy acrobático, con aleteos seguidos de cortos planeos hasta situarse en sus posaderos, arbustos de gran porte o postes de la luz.



ZONAS DE AVISTAMIENTO:

- Se ha podido ver un individuo en el Majuelo.



FECHAS DE AVISTAMIENTO:

- Octubre.

