



# Culebra bastarda



## NOMBRE CIENTÍFICO:

- **Malpolon monspessulanus**



## FAMILIA:

- **Colubridae**



## ORDEN:

- **Squamata**



## LONGITUD:

- **2 m**



## DESCRIPCIÓN:

- Su cabeza es alargada y tiene el hocico puntiagudo, con una depresión entre los ojos y los orificios nasales. Las escamas sobre los ojos son prominentes, lo que confiere a su mirada un aire penetrante y feroz, y las dorsales son puntiagudas con un pequeño surco longitudinal en el centro.
- Su cola es larga y delgada.
- El color de los adultos varía entre el gris claro, el pardo o el verde oliva.
- En los machos adultos y en ejemplares viejos la zona anterior del cuerpo toma una coloración gris oscura conocida como "silla de montar".
- El vientre suele ser amarillento o blancuzco.



## HABITAT:

- El hábitat de la culebra bastarda son preferentemente las zonas secas en terrenos arenosos, rocosos, bosques abiertos, e incluso las zonas de cultivo.



## COSTUMBRES Y ALIMENTACIÓN:



- Especie terrestre poco trepadora.
- Es muy activa y agresiva.
- Se alimenta de pequeños mamíferos (hasta gazapos de conejo), aves y lagartos, capturando los jóvenes principalmente de lagartijas e invertebrados.



### REPRODUCCIÓN:

- El celo es primaveral (abril – mayo).
- La puesta tiene lugar a principios de verano y consta de 4 a 18 huevos alargados, de más de 4 cm.
- Las crías nacen hacia el final del verano.



### CURIOSIDADES:

- Es la mayor culebra de la Península Ibérica
- Aunque se trata de una especie venenosa, por la disposición de su aparato inoculador, no suele ser peligrosa para las personas
- Es agresiva y si es molestada se erguirá como una cobra y hará notar su enfado con un siseo penetrante.
- De movimientos rápidos y ágiles.
- Durante el verano le gusta subirse a los árboles.
- El veneno es inoculado por unos colmillos posteriores que sólo llegan a morder cuando su presa ya está bastante dentro de su boca, por lo que su mordedura, aunque puede ser dolorosa, no es peligrosa para el hombre.

