



Estornino negro

NOMBRE CIENTÍFICO:

- *Sturnus unicolor*

FAMILIA:

- *Sturnidae*

ORDEN:

- Passeriformes



DESCRIPCIÓN:

- Longitud: 19-22 cm.
- El macho es negro con lustre púrpura y sin pintas.
- Pico amarillo.
- La hembra es menos lustrosa.
- En invierno ambos sexos son de color negro grisáceo salpicado de muy pequeñas motas.

HÁBITAT:

- Pequeñas colonias sobre acantilados, poblaciones y aldeas.
- También en árboles y cortijos.
- Anida en agujeros de árboles, acantilados, ruinas, tejados, etc.

COSTUMBRES Y ALIMENTACIÓN:

- Forma bandos.
- Se alimenta de una gran variedad de invertebrados, entre los que predominan larvas de insectos y escarabajos.
- Ocasionalmente puede llegar a capturar vertebrados de pequeño tamaño.
- En otoño e invierno consume también frutos, desde pequeñas bayas a aceitunas.

CRÍA Y NIDIFICACIÓN:



- Anida en colonias.
- Cría y reside junto a viviendas y zonas agrícolas con árboles, a veces en olivares y zonas agrícolas con árboles, a veces en olivares o acantilados con cavidades disponibles.
- El nido es construido principalmente por el macho y forrado por la hembra con plumas, hierba y paja, comúnmente bajo tejas o en agujeros.
- La puesta va de marzo a junio y consta de 4 a 6 huevos azules pálido uniforme.
- La incubación dura de 12 a 14 días y es realizada por ambos padres.
- Los pollos son alimentados por ambos padres y dejan el nido a los 20 ó 22 días.
- Se producen dos crías al año.



DISTRIBUCIÓN Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS:

- Presente en toda la Península Ibérica como residente.

CURIOSIDADES:

- Especie básicamente sedentaria.
- Ave bastante social y cercana al hombre.

ZONAS DE AVISTAMIENTO:

- Esta especie es muy común.
- Se puede ver prácticamente en todos los sitios, aunque está más ligada a zonas donde haya presencia o influencia humana.
- Según nos alejamos de la sierra y nos acercamos al núcleo de población la abundancia va aumentando.

FECHAS DE AVISTAMIENTO:

- Octubre y Noviembre.

