



Lagarto ocelado

NOMBRE CIENTÍFICO:

- *Lacerta lepida*

FAMILIA:

- Lacertidae

ORDEN:

- Squamata



DESCRIPCIÓN:

- Es el lagarto más grande de la península.
- Cuerpo muy robusto, capaz de alcanzar tallas enormes, de extremidades bien desarrolladas y cola de doble longitud que el resto del cuerpo.
- El cuerpo es verde-amarillento, adornado por grandes ocelos azules, coloración juvenil verdosa con ocelos claros.
- Mide normalmente unos 15 cm del hocico a la cloaca, pero han llegado a medirse ejemplares hasta de 23,5 cm.
- Destaca de su tosco aspecto la cabeza, grande, maciza, armada de poderosas mandíbulas, más ancha en los machos.
- Las extremidades, más bien largas, están provistas de fuertes uñas.
- El macho es mayor que la hembra y con colores más vistosos; mientras que él es de color verde con manchas azuladas, la hembra es de color pardo.

HÁBITAT:

- Matorral abierto, taludes, olivares, viñedos, dehesas, claros de bosque mediterráneo.

COSTUMBRES Y ALIMENTACIÓN:



- Debido a su gran tamaño, necesita comer presas más grandes que los habituales insectos y demás invertebrados.
- Los jóvenes son insectívoros y los adultos tienen una alimentación omnívora a base de reptiles, pajarillos, musarañas y ratones.
- En primavera, se convierte en un feroz depredador y devora a los polluelos en sus nidos, se atreve con culebras de pequeño tamaño.
- En verano, además toma las frutas del suelo.
- En tiempos difíciles, cuando escasea la comida, se alimenta de carroña.
- Especie diurna y territorial.

REPRODUCCIÓN:

- En primavera, a finales de abril, cuando se inicia el periodo de celo, los machos van a buscar a las hembras receptoras.
- El lagarto ocelado hembra pone unos 20 huevos o más, entre abril o mayo.
- La incubación de los huevos dura 3 meses, por lo tanto, las crías nacerán a finales de verano.



CURIOSIDADES:

- Utiliza la maniobra de distracción de "abandonar la cola", como en el caso de otros reptiles que usan esta misma táctica. Este apéndice se regenera a razón de dos milímetros diarios.
- Es muy activo durante todo el año, aunque puede aletargarse durante cortos periodos si el tiempo es muy frío.
- La hibernación del lagarto ocelado va de octubre a febrero.
- Es una especie endémica de la Península Ibérica aunque también se extiende por el sudeste de Francia y el nordeste de Italia.

