



# Pico picapinos

## **NOMBRE CIENTÍFICO:**

- Dendrocopos major

## **FAMILIA:**

- Picidae

## **ORDEN:**

- Piciformes

## **DESCRIPCIÓN:**

- Longitud de 23-26 cm. y 38-44 cm. de envergadura.
- Cabeza: Frente amarillenta, capirote negro, nuca roja y mejillas blancas, separadas de la garganta por una línea negra desde el pico y hasta la nuca, prolongándose hasta los lados del pecho, sin formar un collar continuo.
- Su ojo es rojo.
- El cuello es negro con una mancha blanca a cada lado.
- Dorsales negras, con gran mancha blanca longitudinal en los 'hombros'.
- Las alas son negras, con manchas blancas.
- La cola también es negra, con las plumas laterales barreadas de blanco.
- Partes inferiores blancuzcas, algo parduscas, con la parte trasera del abdomen de color rojo vivo.
- Su pico es negruzco y sus patas gris-verdosas.
- La hembra es similar al macho pero sin la mancha roja en la nuca.



## **HABITAT:**

- Vive en bosques variados, tanto de frondosas como de coníferas, sobre todo en las zonas de montaña.
- A veces, es posible verlo en sotos fluviales.

## **COSTUMBRES Y ALIMENTACIÓN:**



- Su vuelo es característico de pico, ondulado y cerrando las alas después de cada aletazo.
- Es un ave poco gregaria, casi siempre aparece sola o en pareja.
- Tiene costumbres de pájaro carpintero: trepa por los troncos, apoyado en la cola y sujeto con las patas.
- Se alimenta de insectos, pero también de piñones y otros frutos secos, savia y frutos silvestres.



### **CRÍA Y NIDIFICACIÓN:**



- Su nidificación empieza a finales de marzo, pero fundamentalmente en los meses de abril y mayo.
- Cría en todo tipo de terrenos arbolados, especialmente con grupos de píceas y pinos, pero también cría en parques y jardines. Suele utilizar para la cría los agujeros excavados en los árboles, a varios metros de altura.
- Los nidos son cavidades alargadas con entrada

circular y estrecha, sin tapizar.

- La hembra suele poner 4 ó 6 huevos de color blanco.
- La incubación aunque es compartida por ambos miembros de la pareja, corre a cargo en su mayoría por la hembra.
- Dura unos 12-13 días.



### **DISTRIBUCIÓN Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS:**

- Aunque se encuentra desde el nivel del mar hasta los 2300 metros de altitud, en la Península Ibérica es más abundante en los bosques mixtos de montaña.
- Aparece como residente en la mayor parte de la península, exceptuándose en ciertas áreas al este.
- Se trata de una especie anual y sedentaria en sus áreas de cría.





### **CURIOSIDADES:**

- Tanta es su fidelidad a su tronco de árbol que si el viento lo derriba o es cortado y dejado en el suelo, los picapinos continúan tamborileando en él.
- Trepa verticalmente, lateralmente o incluso en círculos a la vez que pica la corteza.



### **ZONAS DE AVISTAMIENTO:**

- Se han identificado al menos dos individuos,:
  - El primero se observó en la zona del Tayar, justo en frente de la Casa de Valdezarza.
  - El segundo se observó días después en el Área Recreativa Valdehierro (no se descarta la posibilidad de que se tratara de dos individuos distintos).
- La presencia de esta ave en este último punto queda comprobada con los “picoteos” del pájaro a los árboles, que se oían perfectamente aunque no se pudiera ver.



### **FECHAS DE AVISTAMIENTO:**

- Finales de octubre y principios de noviembre.

