



Pinzón vulgar

NOMBRE CIENTÍFICO:

- *Fringilla coelebs*

FAMILIA:

- Fringilidae

ORDEN:

- Passeriformes

DESCRIPCIÓN:

- Longitud: 14-16 cm.
- Las partes inferiores, las mejillas y el cuello son de color rosado.
- Frente negra.
- Parte superior de la cabeza y cuello gris azulado y dorso castaño.
- Las alas son un poco más oscuras y presentan una doble franja alar blanca.
- La cola es negra bordeada de dos franjas longitudinales blancas.
- La hembra es menos llamativa y presenta el dorso y cabeza pardo oliváceo.
- Fuera de la época de cría son gregarios, incluso con otros fringílidos como el jilguero.

HÁBITAT:

- Campos de cultivo, cunetas, dehesas, bosques, sotos y jardines.
- Siempre en zonas donde haya abundancia de semillas.
- Fuera de la época de cría también frecuenta cultivos, yermos, jardines y otros ambientes.





COSTUMBRES Y ALIMENTACIÓN:

- Consume sobre todo materia vegetal.
- Principalmente semillas, aunque también frutos, brotes tiernos y flores.
- En primavera abandonan un poco esta dieta y también se alimentan de coleópteros, orugas, tijeretas, pulgones y arañas.
- Los pollos son alimentados con orugas e insectos.

CRÍA Y NIDIFICACIÓN:

- En febrero el macho comienza a defender su territorio, que será el mismo del año anterior.
- La hembra es la encargada de construir el nido.
- El nido lo hacen en arbustos o árboles, pero siempre muy bajo.
- Cría en todo tipo de bosques, siempre que tengan árboles bien desarrollados, refugiándose en zonas deforestadas o secas, dehesas y parques.
- Ponen 4-5 huevos de fondo verdoso o azulado con manchas grises, pardas y rojizas.
- La incubación la realiza la hembra durante 12-13 días.



DISTRIBUCIÓN Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS:

- Residente en la mayor parte del territorio.
- En nuestra latitud el pinzón es sedentario

CURIOSIDADES:

- Cuando acaba el verano hay un cambio radical en el comportamiento, dejan de cantar y se esconden, por lo que parece que han abandonado el territorio.

ZONAS DE AVISTAMIENTO:

- A pesar de ser un ave muy común en la sierra, la mayoría de los individuos identificados se han encontrado en árboles que se encuentran alrededor de la Ermita de Valdehierro.

FECHAS DE AVISTAMIENTO:

- Octubre y noviembre.

