



Ratonero

NOMBRE CIENTÍFICO:

- *Buteo buteo*

FAMILIA:

- *Accipitridae*

ORDEN:

- Falconiformes



DESCRIPCIÓN:

- Sus medidas típicas de 51 a 57 cm. de longitud y de 110 a 130 cm. de envergadura, lo que le hace una rapaz de tamaño medio.
- Esta ave rapaz de alas anchas tiene una amplia variedad de plumajes, puede variar extremadamente, desde casi blanco hasta totalmente oscuro, aunque la fase más común es la del plumaje marrón pardo en distintas tonalidades, siendo más pálido en la franja pectoral y con algunas manchas blanquecinas en la zona central de las alas.
- Posee una cola más bien corta y visiblemente ancha. La cabeza también es bastante ancha.

HÁBITAT:

- Tiene preferencia por zonas boscosas antes que de cultivo o terrenos con monte bajo, aunque es en estos espacios más abiertos donde realiza sus tareas de caza.



COSTUMBRES Y ALIMENTACIÓN:

- La alimentación se basa en pequeños mamíferos como ratones y conejos.
- Complementan su dieta con aves, sus pichones y sus huevos, pequeños reptiles aunque de vez en cuando atrapan una serpiente, anfibios o invertebrados.
- También come carroña, incluyendo la de peces.
- Caza volando sobre los terrenos descampados, parado en una percha y caminando por la tierra.



CRÍA Y NIDIFICACIÓN:

- Ambos sexos construyen un abultado nido de ramas, decorado a menudo con hojas, musgos o algas, generalmente en árboles, y también en bordes rocosos.
- Pone, de marzo a mayo, de 2 a 3 huevos blancos con marcas chocolate a castaño rojizo.
- La incubación dura alrededor de 36 días y es realizada por ambos padres. Los pollos, son alimentados por ambos padres y abandonan el nido tras unos 50 días.

DISTRIBUCIÓN Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS:

- Se trata de un ave que se puede encontrar en toda la Península Ibérica, teniendo una presencia estable durante todo el año en la mayoría de las grandes sierras.





- Los migrantes que llegan a la Península durante el invierno son de origen nórdico.

CURIOSIDADES:

- Incluida en el Catálogo Nacional de especies amenazadas con la categoría de "interés especial".
- El vuelo en círculo es común durante todo el año, especialmente por parte de los machos.
- Generalmente no forman bandadas, pero pueden ser vistos juntos en las migraciones o en hábitat propicios.
- En libertad llega a vivir 25 años, en cautividad puede llegar a los 30 años.
- Es una de las rapaces que más ha disminuido en los últimos años debido fundamentalmente a la gran deforestación (incendios forestales) y a la persecución directa por parte del hombre sobre todo por el colectivo de cazadores.

ZONAS DE AVISTAMIENTO:

- Se han visto desde el Aula de la Naturaleza "Valdehierro".

FECHAS DE AVISTAMIENTO:

- Octubre y noviembre





Fauna de Madridejos



Oficina Verde
Plaza del Ayuntamiento
45710 Madridejos
Telf: 925460016
oficinaverde@madridejos.es
auladelanaturaleza@madridejos.es