



Topillo común



NOMBRE CIENTÍFICO:

- *Microtus duodecimcostatus*



FAMILIA:

- *Cricetidae*



ORDEN:

- *Rodentia*



LONGITUD:

- 8,5 – 11 cm.



PESO:

- 20 – 30 gr.



LONGEVIDAD:

- En torno a los 2 años.



DESCRIPCIÓN:

- Cuerpo con aspecto cilíndrico, dotado de unas patas muy cortas.
- La cola, de un color claro uniforme y también muy corta, de modo que no supera los 3,5 cm.
- Los ojos del topillo son pequeños, las orejas muy cortas, casi ocultas por el pelaje, y el cráneo aplanado.
- El pelaje del topillo común o mediterráneo es relativamente corto, de color marrón u ocre, presentando una franja más clara, de color grisáceo, en los flancos y vientre.





HABITAT:

- Necesita suelos con cierta humedad. Su óptimo lo encuentra en praderas y en campos de cultivo de herbáceas de regadío.



ALIMENTACIÓN:

- Se alimenta fundamentalmente de semillas y frutos de árboles, rizomas, bulbos, tubérculos, raíces, granos de cereal, etc., llegando a consumir también pequeños invertebrados.



REPRODUCCIÓN:

- El topillo está sexualmente activo durante todo el año.
- La gestación dura veinticuatro días, al cabo de los cuales nacen de 2 a 3 crías, desnudas y ciegas con la piel de un color sonrosado, que deposita en el interior de la madriguera, donde acondiciona un nido.
- La lactancia dura unas dos semanas.



CURIOSIDADES:

- Posee unos incisivos de crecimiento rápido, pues la actividad cavadora, les genera un continuo desgaste que hay que contrarrestar
- Tradicionalmente son perseguidos por el hombre, que ve en ellos un molesto e indeseable visitante de sus campos y huertos.
- Topillo endémico de la península Ibérica y sur de Francia, cuyo aspecto, particularmente adaptado a la vida subterránea, es muy característico,
- La pequeña longitud de la cola, los diferencia de un modo claro de otros roedores.



HUELLA:

- Por su poco peso no suele quedar marcadas, ni siquiera en los medios óptimos. En la nieve deja un rastro continuo y ondulado, muy característico del paso del animal.

