



Triguera

NOMBRE CIENTÍFICO:

- *Miliaria calandra*

FAMILIA:

- Emberizidae

ORDEN:

- Passeriformes



DESCRIPCIÓN:

- El triguero es un ave pequeña, aunque de las mayores dentro de los escribanos.
- Mide entre 16 y 19 cm.
- Manto pardusco y listado, mientras que el vientre y el pecho son blancos con pequeñas listas oscuras. La cola carece de las bandas exteriores blancas que otros escribanos.
- No hay diferencias notables entre macho y hembra.
- Tiene un pico bastante grueso, negruzco por encima y amarillento por debajo.

HÁBITAT:

- Habita sobre todo en zonas abiertas, ya sean áreas de cultivo o de matorral bajo.



COSTUMBRES Y ALIMENTACIÓN:

- Se alimenta principalmente de semillas e insectos, como escarabajos, saltamontes, mariposas y orugas.
- Los divisa desde el posadero y se lanza sobre ellos.
- Cuando está en tierra picotea las semillas caídas entre el pasto o los rastros.



CRÍA Y NIDIFICACIÓN:

- A principios de mes de abril comienza los cortejos y la construcción del nido.
- El nido está ubicado en el suelo, formado por hierbas y tallos secos, generalmente es la hembra la que lo construye y ella también es la única que incuba durante unas dos semanas, tras las cuales nacen de tres a cinco poyos.
- Ambos congéneres buscan alimento, pero es la hembra la que se lo da a los poyos, que pasados unos diez días abandonarán el nido.
- Es normal que haya una segunda nidada, antes del mes de junio.



DISTRIBUCIÓN Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS:

- Prácticamente ocupa toda la Península Ibérica.
- La población española es sedentaria, a pesar de realizar ciertos movimientos dispersivos en agosto.
- Muchos individuos de otras zonas de Europa se acercan a la Península durante el invierno. En esos meses, forman grandes bandadas que descansan por las noches en los cañaverales.

CURIOSIDADES:

- Su canto es un reclamo corto seguido de un ruido parecido al de un tintineo de llaves. Parece ser que su canto es más fuerte durante la época de cría. También canta mientras vuela y el macho lo hace repetidamente mientras la hembra está incubando en el nido
- Se ha observado la conducta polígama del macho, que aunque no se da siempre, si se suele producir sobre todo cuando existe una población superior de hembras en los territorios ocupados.
- La intensificación agrícola es su principal amenaza por la eliminación de linderos y ribazos y el uso de plaguicidas.

ZONAS DE AVISTAMIENTO:

- Aula de la Naturaleza “Valdehierro”.

FECHAS DE AVISTAMIENTO:

- Octubre y Noviembre.





Fauna de Madridejos



Oficina Verde
Plaza del Ayuntamiento
45710 Madridejos
Telf: 925460016
oficinaverde@madridejos.es
auladelanaturaleza@madridejos.es