



Verderón común

NOMBRE CIENTÍFICO:

- *Carduelis chloris*

FAMILIA:

- *Fringillidos*

ORDEN:

- *Paseriformes*

DESCRIPCIÓN:

- Mide de 13 a 15 cm de largo.
- El macho es de color verde amarillento, con llamativas manchas amarillas en las alas y cola.
- La hembra es de color más apagado y tiene tonos marrón castaño en la parte posterior, y las manchas de sus alas y cola son de color amarillo pálido.



HÁBITAT:

- Esta especie habita sobretodo en zonas abiertas con presencia de árboles, como claros de bosques, huertas, cultivos de cereales, jardines.
- Se puede observar con frecuencia en zonas con presencia humana.

COSTUMBRES Y ALIMENTACIÓN:

- Su pico corto y cónico es lo suficientemente poderoso para cascar semillas grandes y duras.
- En otoño visita los viñedos y frutales para comer fruta madura.
- Soporta bien los rigores del invierno y sabe encontrar su alimento incluso cuando la capa de nieve es espesa.
- En primavera y verano se alimenta también de insectos.



CRÍA Y NIDIFICACIÓN:

- Comienza el celo a primeros de marzo.
- Ambos padres construyen el nido en forma de copa, de hierba, musgo y raicillas, en arbustos, árboles o setos.
- Puesta, de abril a agosto, de 4 a 6 huevos blancos o azules claros con motas y rayas pardo rojizas.



- Incubación solo por la hembra unos 13 días, el macho la alimenta.
- Los pollos son cebados por ambos padres.
- Cuando la hembra se dispone a hacer otro nido, el padre tiene que quedarse sólo a cargo de las crías hasta que consigan el alimento por sí mismas.
- Realizan dos puestas anuales, ocasionalmente tres.

DISTRIBUCIÓN Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS:

- La especie es, en gran parte, sedentaria en todo su hábitat. Sin embargo, existen movimientos, unos migradores y otros simplemente erráticos de corto radio en otoño e invierno, también hay una cierta trashumancia invernal que se acusa, sobre todo, en los jóvenes, y rara vez en los adultos de más de un año de vida.

CURIOSIDADES:

- Es un pájaro que se ha adaptado a la presencia del hombre.
- En el invierno suele juntarse en bandadas por zonas de viñas y huertas.

ZONAS DE AVISTAMIENTO:

- Se han observado estas aves desde el Aula de la Naturaleza “Valdehierro”

FECHAS DE AVISTAMIENTO:

- Octubre y noviembre.

